

Kap 14.10 EPOCH behandling med Homepump

Läkemedel

Preparat	Dos	Administrering
Etoposid	50 mg/m ²	I.v. inf. dag 1-4 (=96 h)
Vinkristin	0,4 mg/m ²	
Doxorubicin	10 (12,5) mg/m ²	
Cyklofosamid	750 mg/m ²	I.v. injektion dag 6 i 15 - 20 min
Prednisolon	60 mg tablett	P.O. dag 6
Kuren ges var 3:e vecka		

Se lokala rekommendationer för EPOCH

Rekommenderade pumpar

Preparat	Pumpmodell	Fyllnadsvolym	Infusionstid
Doxorubicin + Vinkristin	C 270020	201 ml	4 dygn (96 h)
Etoposid*	C 270100 el. 2 st C 125050*	246 ml 2 x 120 ml	1 dygn (24 h) x 4

* Lösningens koncentration får ej överstiga 0,4 mg/ml

Pumpbehov för en behandling:

1 pump C 270020 (Doxorubicin + Vinkristin) och

4 pumpar (1/dygn) C 270100 alt. 8 pumpar (2/dygn) C 125050.

*Silikonpumpar

Beredning

- Doxorubicin och Vinkristin blandas i en pump.
- Etoposid ges i en pump som byts var 24:e timme, alt. delas Etoposiddosen på två pumpar som båda byts var 24:e timme.