

Kap 14.13 PF-kur med Homepump

Läkemedel

| Preparat | Dos | Administrering |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Cisplatin el. Carboplatin* | 100 mg/m ² | I.v. inf. 1-2 h |
| | 400 mg/m ² | I.v. inf. 1-2 h |
| Flurouracil (5-Fu) | 1000 mg/m ² /dygn | Kontinuerlig i.v. inf. |

*Vid nedsatt njurfunktion eller vid svåra cisplatin biverkningar.

Speciella åtgärder och dosreduktion: Se lokala rekommendationer för PF-kur.

Rekommenderade pumpar

| Preparat | Pumpmodell | Fyllnadsvolym | Residualvolym | Infusionstid |
|-----------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| Flurouracil (5-Fu) | C 270010 | 143 ml | ≤ 8 ml | 5 dygn |
| | C 270020 | 243 ml | | |

Pumpbehov för en kur: 1 pump

Beredning:

1. Stäng slangklämman
2. Fyll pumpen med 10 ml NaCl (minimerar risk för utfällning och stopp i slangen).
3. Öppna slangklämman, ta bort änddroppen och prima pumpen tills en droppe syns i slangänden.
4. Stäng slangklämman och sätt på hatten
5. Fyll på med 5-Fu och resten av spädningsvätskan + residualvolymen.

Behandling

Infusionen av Cisplatin/Carboplatin ges på traditionellt sätt. Därefter kopplas 5-Fu pumpen och patienten går hem.