

Rådgör alltid med din veterinär innan du behandlar

Muggbehandling

Skorporna skyddar såret, men under dem samlas bakterier och svamp. Därför måste dessa först avlägsnas innan behandlingen.

Genom att stryka på mjukgörande salva som vaselin eller Salisylvaselin mjuknar skorporna och kan lätt avlägsnas. Låt verka 20 – 60 minuter, kan även sitta längre.

Därefter kan skorporna tas bort. Om dem inte lossnar lätt, orsakar det sår genom att riva bort dem.



Därefter sköljs salvan av och behandlingen fortsätter med schamponering av klorhexidin. Klorhexidin är antiseptiskt som dödar och hämmar tillväxten av bakterier och svamp. Låt verka i upp till 20 min. Skölj av och torka med ren och torr handduk.

Innan behandlingen skall hårremmen runt såret klippas. Annars kan hårstråna irritera och infektera såret.

Området rengörs med alcogel och kompress. Alcogel rengör huden från bakterier.





Stryk därefter rikligt med mannuka honungsalva. Mannuka honungsalva är antiseptisk och antiinflammatorisk och hjälper till med läkningen. Täck salvan med nonwoven kompress. Nonwoven har en silkig yta som gör att den inte fastnar i såret.

Sedan börjar bandageringen med polstervadd. Polstervadd är komprimerad bomull. Den gör att bandageringen håller kompress och resten av bandageringen stabil och motverkar att det glider.



Sedan lindas vetrap över polstervadden. Vetrap är elastisk och fästande linda, den får därför inte dras åt. Detta kan göra skada på senorna.

För extra fäste, tejpas Tensoplast klisterlinda på hårrem och över på bandaget samt på hoven över på bandaget. Linda gärna över tåspetsen för bättre hållbarhet. Dock skall Tensoplast klisterlinda användas med försiktighet. Den är väldigt stark och elastisk, så den skall läggas på väldigt lätt och försiktigt, den får inte dras åt. Den får inte sättas över kotled, kronled eller hovled.



Bandaget kan sitta upp till 3 dagar om det hålls torrt och rent. Finns det mugg kvar skall proceduren upprepas eller om det skulle återkomma.