

## Kap 14.3 Foscavir® behandling med Homepump

### Läkemedel

Preparat	Dos/dygn	Administrering
Foscarnet	40 mg/kg x 3 i 2-3 veckor	I.v. inf.
	60 mg/kg x 3 i 2-3 veckor	I.v. inf. ≥1 h
	90 mg/kg x 2 i 2-3 veckor	I.v. inf. ≥2 h
	90 - 120 mg/kg x 1, 7 dagar/vecka	

### Rekommenderade pumpar

Pumpmodell	Fyllnadsvolym	Residualvolym	Infusionstid
E 251750	200 - 335 ml	≤8 ml	1 - 2 h
E 401000	200 - 500 ml	≤10 ml	1 h 15 min - 2 h 40 min
E 402000	250 - 500 ml		1 - 2 h 40 min
E 502500	300 - 550 ml		1 - 2 h 15 min

Pumpbehov för en behandling: 10 - 20 pumpar

### Beredning

Pumpen fylls först med beräknad mängd NaCl + residualvolym, sedan tillsätts ordinerad dos Foscarnet, till önskad totalvolym.

Om större volym (lägre koncentration) önskas, kan dosen Foscarnet fördelas på två pumpar som parallellkopplas och ges samtidigt. Den ordinerade dosen delas då på två och fördelas i pumparna.